

* 定期予防接種について *

【益城町】令和5年7月作成

種類	接種回数	定期接種対象年齢	標準的な接種時期	接種間隔、注意事項	
どちらかを接種	ロタウイルス (ロタリックス)	2回	生後6週0日後～24週0日後まで	生後2か月から接種開始する	出生14週6日後までに開始する 【接種間隔】 1回目⇒(27日以上)⇒2回目
	ロタウイルス (ロタテック)	3回	生後6週0日後～32週0日後まで	生後2か月から接種開始する	出生14週6日後までに開始する 【接種間隔】 1回目⇒(27日以上)⇒2回目⇒(27日以上)⇒3回目
ヒブ (インフルエンザ菌b型)	初回	3回	2か月～5歳になる前日まで	生後2か月～7か月になるまでに接種開始する	【接種間隔】 1回目⇒(27～56日)⇒2回目⇒(27～56日)⇒3回目 ※接種開始が生後7か月を超えた場合は接種回数が異なります。詳しくは医師へご相談ください。
	追加			1回	
小児用肺炎球菌	初回	3回	2か月から5歳になる前日まで	生後2か月～7か月になるまでに接種開始し、1歳までに初回(3回分)接種完了する	【接種間隔】 1回目⇒(27日以上)⇒2回目⇒(27日以上)⇒3回目 ※接種開始が生後7か月を超えた場合は接種回数が異なります。詳しくは医師へご相談ください。
	追加			1回	
B型肝炎	3回	1歳になる前日まで	生後2か月から接種開始し、9か月になる頃までに接種完了する。	【接種間隔】 1回目⇒(27日以上)⇒2回目 1回目⇒(139日以上)⇒3回目	
4種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)	1期初回	3回	生後2か月～7歳半になる前日まで	生後2か月～1歳になるまでに初回(3回分)接種する。	【接種間隔】 1回目⇒(20～56日)⇒2回目⇒(20～56日)⇒3回目
	1期追加			1回	
2種混合 (ジフテリア・破傷風)	1回	11歳～13歳になる前日まで	11歳～12歳になるまで		
BCG	1回	1歳になる前日まで	生後5か月～8か月になるまで		
麻しん・風しん混合	1期	1回	1歳～2歳になる前日まで		※小学校就学の前日(3/31)までに接種
	2期	1回	小学校就学前の1年間(年長の時期)		
水痘	2回	1歳～3歳になる前日まで	1歳～1歳3か月になるまでに接種開始	【接種間隔】 1回目⇒(3か月以上)⇒2回目 ※標準的には6か月～12か月の間隔をあける	
日本脳炎	1期初回	2回	生後6か月～7歳半になる前日まで	3歳～4歳になるまでに接種完了	【接種間隔】 1回目⇒(6日以上)⇒2回目 ※標準的には6日～28日の間隔をあける
	1期追加	1回	※特例措置対象者：20歳未満(平成19年4月1日以前に生まれた者)	4歳～5歳になるまでに接種	【接種間隔】 1期初回(2回目)⇒(6か月以上)⇒1期追加 ※標準的にはおおむね1年の間隔をあける
	2期	1回	9歳～13歳になる前日まで ※特例措置対象者：20歳未満(平成19年4月1日以前に生まれた者)	9歳～10歳になるまでに接種	
いずれかを接種	HPVワクチン【2価】 (子宮頸がん)	3回	小学6年生～高校1年生就学時期相当までの女子	中学1年生就学時期相当	【2価の接種間隔】 ・1回目⇒(1か月)⇒2回目⇒(2か月半以上)⇒3回目 ・1回目⇒(6か月)⇒3回目
	HPVワクチン【4価】 (子宮頸がん)	3回	※R6年度までキャッチアップ接種あり 対象：平成9年生まれ～高校2年生就学時期相当までの女子		【4価、9価の接種間隔】 ・1回目⇒(2か月)⇒2回目⇒(3か月以上)⇒3回目 ・1回目⇒(6か月)⇒3回目
	HPVワクチン【9価】 (子宮頸がん)	3回			