

＊ 定期予防接種について ＊

【益城町】 令和8年7月作成

種類		接種回数		定期接種対象年齢	標準的な接種時期	接種間隔、注意事項
どちらかを接種	ロタウイルス (ロタリックス) (1価)	2 回		生後 6 週 0 日後～2 4 週 0 日後まで	生後 2 か月から接種開始する	出生 1 4 週 6 日後までに開始する 【接種間隔】 1 回目⇒(27日以上)⇒2 回目
	ロタウイルス (ロタテック) (5価)	3 回		生後 6 週 0 日後～3 2 週 0 日後まで	生後 2 か月から接種開始する	出生 1 4 週 6 日後までに開始する 【接種間隔】 1 回目⇒(27日以上)⇒2 回目⇒(27日以上)⇒3 回目
小児用 肺炎球菌		初回	3 回	2 か月から 5 歳になる前日まで	生後2か月～7か月になるまでに接種開始し、 1歳までに 初回(3回分)接種完了する	【接種間隔】 1 回目⇒(27日以上)⇒2 回目⇒(27日以上)⇒3 回目 ※接種開始が 生後7か月 を超えた場合は接種回数が異なります。 詳しくは医師へご相談ください。
		追加	1 回		1歳～1歳3か月になるまで	【接種間隔】 初回3回目⇒(60日以上かつ1歳の誕生日以降)⇒追加 ※接種は1歳の誕生日以降です ※初回の接種開始時期が2歳を超えた場合は追加接種はありません。
B型肝炎		初回	2回	1 歳になる前日まで	生後2か月から接種開始し、 9か月になる頃までに接種完了する。	【接種間隔】 1 回目⇒(27日以上)⇒2 回目 1 回目⇒ (139日以上) ⇒3回目
		追加	1回			
5種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib)		1 期 初回	3 回	生後2か月～7 歳半になる前日まで	生後2か月～7か月になるまでに初回(3回分)接種する。	【接種間隔】 1 回目⇒(20～56日)⇒2 回目⇒(20～56日)⇒3 回目
		1 期 追加	1 回		1期初回接種(3回目)終了後、6月～1年半の間隔をあける	
2 種混合 (ジフテリア・破傷風)		2 期	1 回	1 1 歳～1 3 歳になる前日まで	11歳～12歳になるまで	
BCG			1 回	1 歳になる前日まで	生後 5 か月～8 か月になるまで	
麻しん・風しん 混合		1 期	1 回	1 歳～2 歳になる前日まで		
		2 期	1 回	小学校就学前の 1 年間 (年長の時期)		
水痘		2 回		1 歳～3 歳になる前日まで	1 歳～1 歳 3 か月になるまでに接種開始	【接種間隔】 1 回目⇒(3か月以上)⇒2 回目 ※標準的には 6 か月～1 2 か月の間隔をあける
日本脳炎		1 期 初回	2 回	生後 6 か月～7歳半になる前日まで	3歳～4歳になるまでに接種完了	【接種間隔】 1 回目⇒(6日以上)⇒2 回目 ※標準的には6日～28日の間隔をあける
		1 期 追加	1 回	※特例措置対象者：2 0 歳未満 (平成19年4月1日以前に生まれた者)	4 歳～5 歳になるまでに接種	【接種間隔】 1 期初回(2 回目)⇒(6 か月以上)⇒1 期追加 ※標準的にはおおむね1年の間隔をあける
		2期	1 回	9 歳～1 3 歳になる前日まで ※特例措置対象者：20歳未満 (平成19年4月1日以前に生まれた者)	9 歳～10歳になるまでに接種	
HPVワクチン【9 価】 (子宮頸がん)		2回 一部 3 回		小学 6 年生～高校 1 年生就学時期相当までの女子	中学1年生になる年の 4 月1日～3 月31日	【9 価の接種間隔】 2回・・・初回を15歳の誕生日の前日までに接種した場合 ・ 1 回目⇒(5か月以上)⇒2 回目 ※標準的には6か月の間隔をあける 3回・・・15歳以上で初回接種を受ける場合 ・ 1 回目⇒(2か月後)⇒2回目⇒ (1回目から6か月後) ⇒3回目